

METATARSALGIA

La metatarsalgia è una sindrome dolorosa che si sviluppa sulla regione anteriore della pianta del piede. Il termine metatarsalgia non definisce un processo patologico determinato, ma semplicemente una sintomatologia dolorosa che può comparire come conseguenza di diversi fattori causali.

La metatarsalgia colpisce maggiormente le donne e abitualmente è associata ad anomalie di appoggio delle teste metatarsali; ciò è confermato spesso dalla presenza di callosità plantari in corrispondenza delle teste metatarsali dolorose.

Nella maggior parte dei casi le metatarsalgie sono di natura biomeccanica e derivano da un alterato carico dell'avampiede al suolo; solitamente la problematica si concentra sul 2° e 3° metatarso. Lo squilibrio del carico può essere dovuto da :

- anomala lunghezza dei raggi metatarsali;
- anomala posizione dei raggi metatarsali e morfotipo del piede (es. piede equino);
- anomala motilità dei raggi o rigidità di una articolazione prossimale (es. articolazione di Lisfranc);

Esistono anche le metatarsalgie così dette non biomeccaniche che hanno origine da malattie che interessano tutto l'organismo (es. artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico, diabete, etc...), da affezioni locali (es. artrite settica) o malattie dei nervi del piede (es. neuroma di Morton).

Nella maggior parte dei casi il paziente presenta callosità plantari in corrispondenza dei metatarsi centrali. Inizialmente tali callosità, espressione di un sovraccarico metatarsale localizzato, sono del tutto asintomatiche e in genere trattate con pedicure regolari.

Con l'andar del tempo compare dolore durante la deambulazione in corrispondenza di queste ipercheratosi in particolare con l'utilizzo di calzature a suola rigida, con tacco, strette o semplicemente a piedi nudi. Nelle fasi acute il dolore può rendere intollerabile la marcia e in alcuni casi si strutturano posizioni anomale d'appoggio finalizzate a schivare i punti dolorosi.



Nei casi più lievi, con dolore poco accentuato, la metatarsalgia si può trattare in modo conservativo con l'impiego di calzature a suola morbida, con cure mediche e fisioterapiche o con l'utilizzo di un plantare ortopedico su misura che metta in scarico le teste metatarsali dolorose.

Nei casi gravi tali soluzioni non possono essere proposte al paziente ed è necessario ricorrere al trattamento chirurgico per ristabilire il normale assetto del carico.

La chirurgia percutanea permette di curare le metatarsalgie attraverso piccole osteotomie di arretra-

mento e sollevamento delle teste dolorose. Due o tre piccole incisioni sul dorso del piede, consentono al chirurgo di intervenire con le microfresa a livello del collo delle teste dolorose. Le osteotomie prodotte non vengono fissate con mezzi di sintesi ma lasciate libere; l'uso della scarpetta rigida ed il carico immediato consentiranno il giusto e corretto riposizionamento; in pratica i metatarsi trovano da soli l'equilibrio e l'assetto geometrico funzionale sollevandosi in quanto sovraccaricati.

Per tutte le patologie sopra descritte [Ortopedia Vimedical](#) mette a vostra disposizione la possibilità di scegliere fra un'ampia gamma di calzature pensate per i problemi dei vostri piedi oltre ad ortesi silicomiche create dai nostri podologi e plantari su misura adatti alle vostre esigenze e costruiti nel nostro laboratorio da tecnici ortopedici specializzati.