



LABORATORIOS
SERVINSUMOS

Mebequino

Suspensión oral de MEBENDAZOL en jeringa de 20mL
ANTIHELMINTICO PARA EQUINOS





PRECAUCIONES

Únicamente para uso oral. Es poco tóxico para el animal, aunque tiene efectos depresores sobre el sistema nervioso central a dosis particularmente altas, y se manifiestan por mareos con somnolencia. También puede occasionar efectos teratógenos. A pesar de que la absorción es baja, el fármaco puede ser detectado hasta dos semanas después de haberse administrado.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 mL de suspensión contiene:
MEBENDAZOL MICRONIZADO 20 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

INDICACIONES

Esta indicado para el control y tratamiento de parásitos gastrointestinales tales como Ascaris spp, Oxyuris spp, grandes y pequeños estróngilos y tenias en caballos, yeguas, potros, asnos y mulas.

DOSIS

10 mg por kilo de peso vivo, en la práctica 5 mL por 100 kilos.

ADMINISTRACIÓN

Oral, directamente en la boca del animal

www.servinsumos.cc
@Laboratorios Servinsumos S.A.



PERIODO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 5 días después de finalizado el tratamiento. No administrar en hembras preñadas en el primer tercio de gestación

PRESENTACIONES

Jeringa por 20 mL.

ESPECIES



Registro ICA N° 2863 DB